

Packhard®

Fertilizante líquido

INFORMACION GENERAL

PACKHARD es una formulación a base de derivados de extractos concentrados de cascarillas agrícolas, ECCA Carboxy, calcio y boro, diseñada para prevenir y corregir problemas de firmeza en los frutos y sus desórdenes fisiológicos por deficiencias de estos nutrientes, mejorando el manejo y alargando la vida de anaquel.

BENEFICIOS

- Asperjado antes de la floración, promueve uniformidad de tejidos florales y posterior cuaja.
- Aumenta el flujo de carbohidratos y Calcio-Boro hacia la fruta.
- Disminuye incidencia de desórdenes fisiológicos por deficiencia de Ca como: mancha café en piña, blossom en tomate, corazón negro en apioque madura de borde en lechuga.
- Disminuye la incidencia de abotellado en el fruto de piña, peca en frutos de papaya o antracnosis en frutos de mango
- Provee mejor tejido epidérmico por mayor síntesis de cera en cáscara del fruto y tejidos foliares.
- Fortalece las paredes celulares del fruto por inducir síntesis de pectinas y pectatos de Ca.
- Mejora la calidad, consistencia de la fruta y potencial de almacenamiento poscosecha.



RECOMENDACIONES

En general todas las aplicaciones de PACKHARD deberán efectuarse durante la etapa de llenado de fruto, asperjándolo desde el cuajado hasta la maduración.

Tomate, Chile, Pepino, Melón, Berenjena, Chile, Fresa, Sandía, Calabacita, Chayote de 2 -4 L/ha, en intervalos de 2 semanas, hasta floración.

Cebolla, Ajo, Zanahoria y otros cultivos de raíz de 2- 4 L/ha, durante la etapa de desarrollo.

Mango, Papaya, Banano, Citricos, Aguacate, Piña, Ornamentales, Café de 2 - 4 L/ha, en intervalos de 3 semanas durante llenado de fruto.

Cultivos anuales: Arroz, Maíz, Frijol, Sorgo, Maní, Algodón de 1 - 3 L/ha, durante fructificación.

Crucíferas: Coliflor, Brocoli, Col de Bruselas, Lechuga de 1 - 3 L/ha a intervalo de 2 semanas durante llenado de cabeza.

¡NATURALMENTE!
Innovak

DISTRIBUIDOR POR:



innovation for agriculture

INNOVA SUPPLY AG S.A.
Grecia, Alajuela
Costa Rica

